

Tài liệu – Triệu chứng Nổi và Chìm của Bệnh Tâm Thần Phân Liệt

Khi nói đến triệu chứng nổi, chúng tôi có ý nói đến:

- Ảo tưởng
- Hoang tưởng
- Loạn tư tưởng

Những triệu chứng này biểu hiện rõ nhất trong thời kỳ cấp tính
Thông thường đi kèm với tính hoang tưởng đa nghi, dẫn đến những nghi kỵ vô căn cứ
và ngờ vực người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình.

Những triệu chứng nổi thông thường có thể trị bằng thuốc tâm thần.

Tiếc thay, có người thì không thể trị được.

Thuốc bắt đầu có tác dụng với những triệu chứng nổi chừng 2 tuần lễ sau và đạt đến
mức tối đa trong khoảng 6 tuần lễ.

Uống thuốc đều đặn có thể làm giảm tỉ lệ bệnh tái phát rồi phải nhập viện xuống chừng
60% trong vòng 2 năm.

Điều quan trọng cần biết, *thuốc không trị dứt* những triệu chứng này, do đó, nếu ngưng
uống thuốc, những triệu chứng nổi sẽ trở lại.

Thực vậy, đa số những triệu chứng nổi đều có thể trị bằng thuốc tâm thần



Khi nói đến triệu chứng chìm, chúng tôi có ý nói đến:

- Bớt hăng hái trong sinh hoạt
- Xa lánh người khác
- Không thể hoặc khó kết bạn
- Cử động chậm chạp
- Dễ bị căng thẳng tinh thần
- Không biết rút kinh nghiệm
- Không thể hưởng thụ cuộc đời

Đa số các loại thuốc thông thường sẽ không trị được các triệu chứng chìm. Dù có nhập viện bao nhiêu lần đi nữa, tình trạng của người bệnh vẫn không thay đổi.

Sự kiện này làm cho cuộc sống của thân nhân rất khó khăn bởi vì những triệu chứng bệnh này có tính cách dài hạn và phân nửa số người bị bệnh tâm thần cấp tính ban đầu đều mắc phải.

Bệnh Tâm Thần Phân Liệt Kinh Niên là ca bệnh mà thuốc không thể trị được các triệu chứng nổi hay chìm. Đối với một số người bệnh tâm thần phân liệt, khả năng hiểu thấu (hiểu và chấp nhận) chứng bệnh cũng thay đổi.

Dưới đây là một số những loại thuốc mới đang được sử dụng khá hiệu quả đối với một số ca bệnh kinh niên nêu trên:

- Clozapine
- Olanzapine
- Risperidone
- Quetiapine
- Amisulpride
- Aripiprizole

